

ンシュウセンブリ (*Swertia diluta* (Turczaninow) Benth. & Hooker—*Sczukinia diluta* Turczaninow—*Frasera diluta* (Turczaninow) Toyokuni) は日本のイヌセンブリ (*Sw. tosaensis* Makino—*Sw. diluta* var. *tosaensis* (Makino) Hara—*F. diluta* var. *tosaensis* (Makino) Toyokuni) に比し、下葉は最も広いものでも狭卵形で、すべて鋭頭をなし決して篋状円頭にはならず、枝の打ち方が異なるため花の配列状態も違っており、イヌセンブリの如く複総状にはならず、花は均等に配置され、花の多い個体では円錐状をなして密生する。花は遙かに大きく、径 2.8 mm に及ぶ。萼裂片は常に鋭頭で主脈上面および縁辺はざらつき、花冠より短いか往々それより長く超出する。葯は細長く広線形で長さ 2.5 mm (イヌセンブリでは長楕円形ないし楕円形で、長さ 1.3 mm) あり、蜜腺は黄色である。

○植物採集覚書 (其二十九) (奥山春季) Shunki OKUYAMA: Tentative list of plants for collectors (29)

九 州 地 方 (其三)

○市房山 (1,722 m 熊本・宮崎県境) 原標本植物 *Nabalus acerifolia* Maxim. [フクオウソウ] Bull. Acad. St.-Pét. 15: 377 (1870). *Saxifraga modesta* var. *stolonifera* Makino ツルジンジソウ 植雑 23: 72 (1900). *Carex Mayebarae* Ohwi ケヒエスゲ Mém. Kyoto Univ. B, 5-3: 256 (1930). *Rhododendron pentaphyllum* var. *villosum* Koidz. ツクシアケボノツツジ 植分 1: 20 (1932). *Dryopteris Miqueliana* var. *fimbriata* Koidz. ヒロハノナライシダ l. c. 28 (1932). *Arisaema simense* var. *Mayebarai* Nakai イチフササマムシソウ 植研 15: 414 (1939). *Elaeagnus Mayebarai* Nakai イチフササグミ l. c. 738 (1939). *Stewartia epitricha* Nakai イチフサヒメシャラ 科博研報 29: 92 (1950).

植 物 [羊] コウヤコケシノブ、ミヤマシケシダ、イワオモダカ、ウスヒメワラビ、シラネワラビ、オオフジシダ、ナカミシシラン、オオクボシダ、ヒメスギラン、スギラン、マンネンスギ。[裸] イチイ、ハリモミ、ヒメコマツ、コウヤマキ、アスナロ。[単] タシロノガリヤス、ツクシミノボロスゲ、イトスゲ、ヒメジュズスゲ、ミヤマイワスゲ、ヒナスゲ、コハリスゲ、ホソバナコバイモ、ツクバネソウ、タマガワホトトギス、バイケイソウ、ナゴラン、オサラン、ツチアケビ、ツリシスラン、ウチョウラン、ジンバイソウ。[籬] ツクシヤマヤナギ、ブナ、クロフネサイシン、ヤマグルマ、ヤマシャクヤク、タムシバ、オオヤマレンゲ、オガタモノキ、シロモジ、コガネネコノメ、ギンバイソウ、ヤハズアジサイ、ナンゴククロクモソウ、ヤシャビシャク、イワキンバイ、ハスノハイチゴ、コフウロ、サワダツ、コバノクロズル、ナツツバキ、ミヤマタニタデ。[合] ベニドウダン、シロドウダン、ヒカゲツツジ、ツクシシャクナゲ、バイカツ

ツジ, ヤクシマホツツジ, コハクウンボク, ウスギモクセイ, スズコウジュ, シソバ  
 タツナミ, シシンラン, ミヤマムグラ, ムシカリ, ミヤマガマズミ, ヤマシグレ, シデ  
 シャジン, オオモミジガサ, ツクシコウモリ, テバコモミジガサ, サワギク。

○霧島山 (1,700 m, 宮崎・鹿児島県境) 原標本植物 *Carex chrysolepis* Franch. et  
 Sav. [コイワカンスゲ] Enum. 2: 144 (1879). *Saussurea scaposa* Franch. et Sav.  
 [キリシマヒゴタイ] l. c. 408 (1879). *Calanthe kirishimensis* Yatabe キリシマエビネ  
 植雑 6: 253 (1892). *Peucedanum decursivum* var. *angustilobum* Makino ホソバノ  
 ダケ 植雑 24: 61 (1910). *Malus spontanea* Makino ノカイドウ l. c. 23: 295 (1914).  
*Viola pumilio* W. Beck. [フモトスミレ] Beih. Bot. Centr. 34-2: 246 (1916). *Hyd-  
 rangea paniculata* var. *depressa* Nakai コアジサイノリウツギ 植雑 40: 467 (1926).  
*Deschampsia caespitosa* var. *festucaeifolia* Honda コミヤマコメススキ 植雑 40:  
 635 (1927). *Calamagrostis kirishimensis* Honda キリシマノガリヤス l. c. 42: 129  
 (1928). *Arisaema nanum* Nakai ヒメテンナンショウ 植雑 43: 532 (1929). *Asarum  
 hexalobum* var. *perfectum* F. Maek. キンチャクアオイ 植雑 45: 567 (1932). *Athy-  
 rium kirishimense* Tagawa キリシマヘビノネゴザ 植分 2: 22 (1933). *Turpinia  
 ternata* Nakai ショウベンノキ Journ. Arn. Arb. 5: 78 (1934). *Sasamorpha Naka-  
 shimana* Koidz. キリシマズ 植分 5: 164 (1936). *Cirsium suffultum* forma *albi-  
 florum* Kitam. シロバナツクシアザミ Comp. Jap. 1: 118 (1937). *Sasa kirishimensis*  
 Koidz. キリシマコザサ 植分 5: 254 (1938). *Sasa tikusialpina* Koidz. ミヤマチャ  
 ボザサ l. c. 8: 57 (1939). *Euphrasia multifolia* var. *kirishimana* Y. Kimura クモ  
 イコゴメグサ 植分 13: 204 (1943). *Gentiana kirishima-montana* Honda キリシマ  
 リンドウ 植研 24: 27 (1949). *Viburnum erosum* var. *osumianum* Hiyama キリシ  
 マコバノガマズミ 植研 31: 224 (1956).

植 物 [羊] オオバノヒノキシダ, ミヤマノコギリシダ, スカイタチシダ, シノブ  
 カグマ, ユノミネシダ, ホテイシダ, イワヒトデ, サジラン, イワヤナギシダ, アオネ  
 カズラ, ミヤジマシダ, ハチジョウシダ, オオカグマ, ヒモラン, マツバラン。[裸]  
 イヌマキ, ナギ, イチイ, カヤ, ハリモミ, ツガ, アスナロ, ミヤマビャクシン。[単]  
 ミヤマヌカボ, ヒロハコメススキ, ショウジョウスゲ, ヒナスゲ, ケヒエスゲ, ハリガ  
 ネスゲ, ジングウスゲ, ミカズキグサ, ヤマコンニャク, ユキモチソウ, アオテンナン  
 ショウ, キミカゲソウ, キバナチゴユリ, ツクシショウジョウバカマ, ユウスゲ, ノヒ  
 メユリ, マイズルソウ, マルパサンキライ, キンバイザサ, ノハナショウブ, ヒナノシャ  
 クジョウ, キリシマシャクジョウ, ナゴラン, マメズタラン, キエビネ, イチヨウラ  
 ン, マツラン, ツリシュスラン, イイヌマムカゴ, ガンゼキラン, ヒトツボクロ。[離]  
 ノヤナギ, ダイセンヤナギ, ブナ, ミズナラ, ヤマグルマ, ハナカズラ, タンナトリカ  
 ブト, ウンゼントリカブト, カザグルマ, オオヤマレンゲ, アワモリショウマ, コジキ

イチゴ、ニワフジ、フウリンウメモドキ、コバノクロズル、クロタキカズラ、ヨコグラノキ、ウドカズラ、ヘラノキ、シハイスミレ、キガンピ、ツクシゼリ、ヒメノダケ、ホソバノダケ。〔合〕イワカガミ、ベニドウダン、シロドウダン、ミヤマキリシマ、ヤクシマホツツジ、サクラソウ、ホウライカズラ、ムラサキ、スズコウジュ、タカクマヒキオコシ、ツクシシオガマ、ホソバヒメトラノオ、キヨスミウツボ、カギカズラ、サワギキョウ、クサヤツデ、ツクシコウモリ、ツクシアザミ、ヤナギアザミ、ハンカイソウ、ヒナヒゴタイ、ツクシヒゴタイ。

○高隈山 (1, 237 m, 鹿児島県) 原標本植物 *Rhododendron pentaphyllum* Maxim. [アケボノツツジ] Bull. Acad. St.-Pét. **31**: 65 (1888). *Pteris kiuschiuensis* Hieron. [ニシノコハチジョウシダ] Hedw. **55**: 341 (1914). *Plectranthus lanceus* Nakai タカクマヒキオコシ 植雑 **37**: 81 (1923). *Berchemia fargifolia* Koidz. オオバミヤマクマヤナギ 植雑 **39**: 21 (1925). *Trachelospermum asiaticum* var. *oblanceolatum* Nakai ナガバテイカカズラ 樹木誌, ed. 2, **1**: 423 (1927). *Viburnum erosum* var. *lanceum* Nakai ナガバガマズミ l. c. 610 (1927). *Sasa elegans* Makino タカクマチク 総覧 1495 (1925); 植研 **5**: 4 (1928). *Carex uber* Ohwi ツクシスゲ Mem. Kyoto Univ. B, **5**-3: 261 (1930). *Tricyrtis ohsumiensis* Masam. タカクマホトトギス 熱農 **2**: 41 (1930). *Tripterygium Doianum* Ohwi コバノクロズル 植分 **1**: 140 (1932). *Rhododendron viscistylum* Nakai ヒメミツバツツジ (同名あり), タカクマミツバツツジ 植雑 **49**: 498 (1935). *Sciaphila takakumensis* Ohwi タカクマソウ 植分 **7**: 133 (1938). *Callicarpa takakumensis* Hatusima タカクマムラサキ 植研 **24**: 81 (1949). *Wikstroemia ohsumiensis* Hatusima タカクマキガンピ 植研 **29**: 232 (1954). *Pellionia japonica* Hatusima キミズモドキ l. c. **34**: 306 (1959). *Dryopteris* × *pseudocommixta* Kurata オオスミイワヘゴ 北陸植 **13**: 43 (1964).

植物 [羊] クルマシダ, ミヤマノコギリシダ, ミヤジマシダ, ツクシイワヘゴ, ナチクジャク, スカイタチシダ, オオミツデ, カツモウイノデ, オオカグマ, カネコシダ, オオクボシダ, ヒメスギラン, ヒモラン。〔裸〕ナギ, イチイ(南限), ハリモミ, ツガ, ヒメコマツ(南限), アスナロ(南限)。〔単〕タシロノガリヤス, タシロスゲ, ヤマコンニャク, ヒメナベワリ, キバナチゴユリ, ツクシショウジョウバカマ, キンバイザサ, ヒナノシャクジョウ, キリシマシャクジョウ, ナゴラン, マメズタラン, キリシマエビネ, キエビネ, ベニシュスラン, ツリシュスラン, セイタカスズムシ, ガンゼキラン。〔雑〕ブナ, マツグミ, ヤマグルマ, フクジュソウ, オオヤマレンゲ, オガタマノキ, マンサク, ハネミイヌエンジュ, シバクサネム, ツゲモチ, コミネカエデ, ヨコグラノキ, ウドカズラ, アカミノヤブカラシ, シハイスミレ, アデク, ヒメノダケ。〔合〕シロドウダン, ベニドウダン, ヒカゲツツジ, ミヤマキリシマ, サクラツツジ, ヤクシマホツツジ, コハクウンボク, ホウライカズラ。